



ISTRUZIONI POST IMPIANTO

- Subito dopo l'impianto, si consiglia di assumere un **analgesico** (Nalgesin, Naklofen, Brufen, ecc.). Gli analgesici sono sia antidolorifici che antinfiammatori. In caso di dolore più intenso, è possibile assumerne altri in seguito.
- Le sono stati prescritti cinque giorni di **terapia antibiotica per prevenire** un'infezione indesiderata che potrebbe impedire la crescita dell'osso nell'impianto (osteointegrazione).
- Oggi si consiglia di fare degli **impacchi freddi** nella zona dell'impianto e di mangiare cibi freddi o tiepidi, oltre al riposare o evitare sforzi eccessivi. Si sconsigliano anche il fumo (almeno fino alla rimozione dei punti) e le bevande alcoliche.
- **L'igiene orale** va continuata normalmente, tranne nell'area della mucosa orale suturata, dove lo spazzolamento e l'uso della doccia dentale sono sconsigliati fino alla rimozione delle suture. Fino ad allora, utilizzare un collutorio (CURASEPT ADS 420; foglio illustrativo allegato).
- Dopo la rimozione delle suture, è necessario **spazzolare accuratamente** anche gli attacchi metallici sopra il labbro (sulcus former), fino ad ottenere un'elevata lucentezza.
- Dopo una settimana, ci sarà una **visita di controllo e la rimozione dei punti**; a quel punto vi prescriveremo per una radiografia di controllo.

Se si verificano problemi nel periodo post-operatorio, come dolore, arrossamento, gonfiore o secrezione purulenta, si prega di chiamare il prima possibile per un appuntamento di controllo.

ISTRUZIONI POST RESTAURO PROTESICO

Dopo l'integrazione dell'impianto e la realizzazione del restauro protesico, per il successo a lungo termine del trattamento implantare è essenziale:

- Stabilire e mantenere una buona igiene orale. Ciò significa **rimuovere accuratamente la placca** con spazzolino e dentifricio ed eventuali accessori (spazzolino elettrico, filo interdentale, scovolino interdentale) **almeno una volta al giorno**, di solito la sera. Al mattino e dopo ogni pasto è consigliabile una nuova pulizia con uno spazzolino e un dentifricio normali. I collutori e i gel orali sono un'aggiunta consigliata allo spazzolamento, ma non lo sostituiscono in alcun modo.
- **Sottoporsi a un controllo preventivo almeno una volta all'anno presso il dentista che ha realizzato la protesi** o presso il dentista personale. Se necessario, il dentista vi indirizzerà a noi. Se siete soggetti a malattie parodontali, fumate o avete altri fattori di rischio per l'infiammazione dei tessuti gengivali, vi consigliamo di fare un controllo dal vostro dentista o igienista orale ogni 6 mesi.
- Come abbiamo detto nell'introduzione, il **fumo è sconsigliato o controindicato** perché riduce l'apporto di sangue ai tessuti della bocca. Ciò riduce l'efficacia della risposta immunitaria della mucosa orale e aumenta la **probabilità di infiammazione dei tessuti che circondano gli impianti (perimplantite)!**